

Entreprise pharmaceutique : JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhausen, Germany +49 6236 41 800

Nom de la drogue: JBL Ektol bac Pond Plus Agent actif : povidone iodée

Forme et contenu: 500 ml de solution pour 10 000 l d'eau de bassin

Type et quantité d'agents actifs: 100 ml de solution contiennent : 5 000 mg de povidone iodée.

Indications: Médicament destiné à combattre les infections bactériennes des poissons d'ornement des bassins de jardin, causées par des bactéries des genres *Aeromonas*, *Pseudomonas*, *Columnaris* et autres. Les symptômes fréquents de telles infections sont : ulcères cutanés, lésions hémorragiques en forme de points, saignements sous-cutanés à la naissance des nageoires, près des opercules et de l'anus, ulcères nodulaires, opercules décollés avec branchies de couleur jaune blanchâtre et respiration très accélérée, yeux exorbités et hydropisie.

Ektol bac Pond Plus est aussi utile dans les cas où le comportement des poissons (nageoires coincées, poissons se frottant contre des objets) indique un début de maladie sans qu'il soit encore possible d'établir un diagnostic précis.

Contre-indications : aucune connue.

Mises en garde : des incompatibilités peuvent apparaître chez les invertébrés (gastéropodes, moules, crustacés, etc.). On devra donc, par mesure de précaution, les exclure du traitement. Les poissons sans écailles (loches) et les poissons affaiblis peuvent réagir de manière sensible au médicament. Commencer par la moitié d'une dose et augmenter prudemment.

Effets secondaires: aucun connu. Si vous deviez constater des effets secondaires sur vos poissons, merci de nous le faire savoir et d'en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

Espèce: Pour poissons d'ornement dans les bassins de jardin.

Utilisation: retirer le charbon actif du filtre avant et pendant l'utilisation du produit et arrêter les appareils UV-C, les ozonateurs et les appareils de dosage de cuivre et de l'acide chlorhydrique. Ventiler le bassin de jardin pendant le traitement. L'ajout de JBL Ektol bac Pond Plus à l'eau devra toujours avoir lieu le matin en gardant les poissons sous observation.

Dosage et durée du traitement: 40 ml pour 800 l d'eau de bassin.

Mélanger la quantité nécessaire avec de l'eau du bassin dans un arrosoir et la répartir bien régulièrement sur le bassin. Ne pas en arroser les plantes. Temps de séjour dans le bassin : 1 semaine.

Nourrissage pendant le traitement : réduire l'alimentation des poissons pendant le traitement.

Filtration pendant le traitement : il est recommandé de nettoyer le filtre avant le traitement.

Indications en cas de surdosage, d'interruption ou d'arrêt du traitement : en cas de surdosage constaté, renouveler la moitié de l'eau.

Après le traitement : après le traitement, filtrer l'eau du bassin de jardin sur un charbon actif pendant 48 heures pour éliminer les résidus de médicaments. Jeter ensuite le charbon actif conformément aux prescriptions en vigueur. Pour finir, renouveler 30 % de l'eau. L'ajout de starters de bactéries dans l'eau de l'aquarium aidera à remplacer les bactéries de nettoyage éventuellement détruites.

Précautions de stockage: Protéger de la lumière et de la chaleur et conserver dans l'emballage d'origine.

Remarques particulières:

- Conserver le médicament hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser pour des animaux servant à la production de denrées alimentaires.
- Médicament à usage vétérinaire. Ne plus utiliser le médicament après la date limite de consommation indiquée.
- Ne pas utiliser avec d'autres médicaments.
- Il faudra s'attendre à des colorations sur des objets de décor.
- Renversé par mégarde sur des textiles, il peut les tacher irréversiblement.
- L'utilisation de produits de traitement de l'eau ou de sel diminue l'efficacité du médicament.

Lot et date limite d'utilisation: bord inférieur du flacon.

Version: 11/2012

