

Gebruiksaanwijzing:

Farmaceutisch bedrijf: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhofen, Germany, +49 6236 41800

Naam van de Drug: JBL MedoPond Plus

Manier van toedienen en inhoud: 500 ml oplossing voor toevoeging aan 10.000 l vijverwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen: 100 ml bevatten:

160 mg malachietgroenoxalaat, 120 mg methylothioniumchloride

Toepassingsgebieden: JBL MedoPond Plus is een effectief bestrijdingsmiddel tegen schimmelaandoeningen, stipziekte (Ichthyophthirius) en andere ééncellige huidparasieten zoals Costia, Trichodina en andere. Witte stippen op de huid en vinnen (niet te verwisselen met de paaiuitslag die in het voorjaar aan de kop van goudvissen te zien is), een melkachtig wit laagje op het lichaam en/of schuren tegen voorwerpen zijn tekenen van een infectie met huidparasieten. Fluweelachtige, dunne blauwachtig witte uitslagen bij vijfervissen duiden op een infectie met de boonvormige huidvervuiler Costia (Ichthyobodo). Op wattenproppen lijkende huidstructuren zijn tekenen van een schimmelaandoening. Vaak is een vermindering van de verschijnselen al na 24 uur zichtbaar. Het middel tast waterplanten niet aan en de verkleuring van het water verdwijnt na korte tijd vanzelf.

Indien vissen met bovengenoemde en andere parasieten zijn besmet, kunnen ze bovendien de hierna genoemde onspecifieke symptomen vertonen: een versnelde ademhaling, stijve vinnen, gebrek aan eetlust, verminderde beweeglijkheid, apathie, donkerder wordende lichaamskleuren, vermeerde slijmvorming.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Waarschuwingen: In geval van langdurig gebruik kan een deel van de reinigingsorganismen in filter en vijver worden vernietigd. Bij schimmelaandoeningen is een enkele behandeling meestal voldoende. Bij ééncellige dierlijke parasieten, bv. stipziekte (Ichthyophthirius) kan het noodzakelijk zijn de behandeling met de gehele dosis op dag 3, 5, 7 enz. t/m ten hoogste dag 15 te herhalen. In dit geval de behandeling met de halve dosis beginnen en de dosis daarna voorzichtig opvoeren.

Bijwerkingen: Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Soort: Voor siervissen in tuinvijvers.

Toepassing: Vóór en tijdens de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur, ozonisatoren, koper- en zoutzuurdoseerapparaten afzetten.

Dien JBL MedoPond Plus in de ochtend toe observeer daarna het gedrag van de vissen. Tijdens de behandeling de vijver van extra zuurstof voorzien.

Dosering en duur van de behandeling: 40 ml op 800 l vijverwater. Doe de benodigde hoeveelheid in een gieter met vijverwater en verdeel het mengsel gelijkmatig over de vijver. Niet op planten gieten.

Bij schimmelaandoeningen is een enkele behandeling meestal voldoende. Bij ééncellige dierlijke parasieten, bv. stipziekte (Ichthyophthirius) kan het noodzakelijk zijn de behandeling met de gehele dosis op dag 3, 5, 7 enz. t/m ten hoogste dag 15 te herhalen.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling: Na het begin van de behandeling de vissen gedurende 2 dagen geen voer geven. Vanaf dag 3 weer beginnen te voeren met een duidelijk gereduceerde hoeveelheid voer.

Filtratie gedurende de behandeling: Biologisch zeer actieve filters die al geruime tijd niet zijn schoongemaakt kunnen de werking van het geneesmiddel voor een deel ongedaan maken. Wij adviseren daarom om het filter vóór de behandeling schoon te maken.

Maatregelen bij overdosering, onderbreking of staking van de behandeling: Na constatering van een overdosis dient de helft van het water te worden verversd.

Indien een dosis is overgeslagen, deze zo spoedig mogelijk alsnog toedienen en de behandeling daarna zoals aangegeven voortzetten.

Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling het vijverwater gedurende 48 uur door een filter met actieve kool filteren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens de voorschriften als afval deponeren. Door toevoeging van een bacteriëstarter aan het vijverwater kunt u de aangetaste kolonie micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen daarna a.u.b. dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarde controleren. Als de nitrietwaarde hoger is dan 0,5 mg/l moet 30% van het water vervangen en een bacteriëstartmiddel aan het aquariumwater toegevoegd worden.

Opslagvoorschriften: Tegen licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

Bijzondere aanwijzingen:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
- Diergeneesmiddel. Na afloop van de aangegeven vervaldatum niet meer gebruiken.
- Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
- Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
- De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die na korte tijd vanzelf verdwijnt.
- Met het verkleuren van decoratieobjecten van kunststof moet rekening worden gehouden.
- Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel irreversibel van kleur veranderen.

Ch.-B. en vervaldatum: zie onderste rand van de fles.

Versie: 11/2012

