

DE Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhofen, Germany +49 6236 41800

Bezeichnung des Arzneimittels: JBL GyroPond Plus, Wirkstoff: Praziquantel

Darreichungsform und Inhalt: 500 ml Suspension als Zusatz für 10.000 l Teichwasser *

Wirkstoffe nach Art und Menge: 100 ml enthalten: Praziquantel 4000 mg

Anwendungsgebiete: GyroPond Plus wirkt gegen Kiemenwürmer (Dactylogyrus); Hautwürmer (Gyrodactylus) sowie Bandwürmer (Cestoda) bei Zierfischen der Ordnungen Karpfenartige, Barschartige, Welsartige und Zahnkärpflinge.

Verstärkte Atembewegungen, Scheuern an Gegenständen, ruckartiges Schwimmen verbunden mit Schreckfärbung oder apathisches „Herumhängen“ sind Anzeichen eines Befalls mit Kiemenwürmern. Bei Hautwürmern können noch blutunterlaufene Stellen auf der Haut zu beobachten sein. Starkes Abmagern bei normalem Fressverhalten deutet auf einen Bandwurmbefall hin.

Ein Befall der Kiemen kann bei größeren Fischen folgendermaßen mit einfachen Mitteln festgestellt werden: Verdächtigen Fisch herausfangen, auf feuchte Unterlage betten und mit einer Pinzette vorsichtig einen Kiemendeckel arheben. Mit einer Lupe (10x) können die weiblichen Würmer leicht erkannt werden.

Die therapeutische Dosis liegt je nach Erregergruppe zwischen 2 (Bandwürmer) und 4 mg/l (Haut- und Kiemenwürmer) Teichwasser, wobei auch höhere Dosierungen von den Fischen in der Regel gut vertragen werden.

*Je Verpackungseinheit dürfen nach gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr als 20 g Praziquantel enthalten sein, weswegen sich eine Reichweite von 10.000 l Teichwasser bei der Behandlung von Bandwürmern und 5.000 l Teichwasser bei Haut- und Kiemenwürmern ergibt.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Warnhinweise: Nicht anwenden bei wirbellosen Tieren (Schnecken, Muscheln, Krebse, Garnelen etc.). Sie sollten vorsichtshalber von der Behandlung ausgeschlossen werden. Geschwächte Fische können empfindlich auf das Medikament reagieren. Zunächst mit halber Dosis beginnen und vorsichtig erhöhen.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Sollten Sie Nebenwirkungen bei Ihren Fischen beobachten, teilen Sie das bitte uns sowie Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Tierart: Für Zierfische im Gartenteich.

Anwendung: Vor und während der Anwendung muss vorhandene Aktivkohle aus dem Filter entfernt werden, UV-C Geräte, Ozon-Geräte, Kupfer- und Salzsäuredosierungsgeräte müssen abgeschaltet werden.

Die Zugabe von JBL GyroPond Plus sollte grundsätzlich morgens unter Beobachtung der Tiere erfolgen. Während der Behandlung ist der Gartenteich zu belüften.

Dosis und Dauer der Anwendung: Flasche vor Gebrauch eine Minute lang kräftig schütteln.

40 ml auf 800 l Teichwasser bei Bandwürmern bzw. 40 ml auf 400 l Teichwasser bei Haut- und Kiemenwürmern. Benötigte Menge in einer Gieskanne mit Teichwasser mischen und gleichmäßig über den Teich verteilen. Verweildauer im Teich 7 Tage.

Bei eierlegenden Kiemenwürmern ist die Behandlung nach 14 Tagen zu wiederholen, um die sich bis dahin aus Eiern entwickelnden Würmer zu erfassen.

Fütterung während der Behandlung: Die Fische sollten während der Behandlung mit reduzierter Futtermenge gefüttert werden.

Filterung während der Behandlung: Biologisch stark aktive Filter, die schon längere Zeit nicht mehr gereinigt wurden, können das Arzneimittel teilweise inaktivieren. Wir empfehlen daher, vor der Anwendung den Filter zu reinigen.

Hinweise für den Fall der Überdosierung, Untertreiben und Absetzen: Eine versehentliche Überdosierung wird von Fischen meist gut vertragen. Vorsichtshalber sollte in diesem Fall das Teichwasser vorübergehend belüftet werden.

Nach der Behandlung: Nach der Behandlung sollte das Teichwasser 48 Stunden über Aktivkohle gefiltert werden, um die Medikamentenreste zu entfernen. Die Aktivkohle ist danach ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Zugabe eines Bakterienstarters in das Teichwasser hilft, geschädigte Reinigungsbakterien wieder zu ersetzen.

Kontrollieren Sie bitte während der Behandlung und die ersten Tage nach Ende der Behandlung täglich die Ammonium/Ammoniak und Nitritwerte. Bei Nitritwerten von über 0,5 mg/l sollte ein 30 % Wasserwechsel durchgeführt werden und ein Bakterienstarter dem Teichwasser zugesetzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung: Vor Licht und Hitze schützen, in der Originalverpackung lagern.

Besondere Hinweise:

- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- Für Tiere: Arzneimittel nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Nicht mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Die Verwendung von Wasseraufbereitern verringert die Wirkung des Arzneimittels.

Ch.-B. und Verfalldatum: siehe unterer Flaschenrand.

Stand der Fassung: 01/2013

